

პაციენტის დღიური

ფილტვის კონიკული ობსტრუქციული ლავალაგა



USAID
აშშის სამსახურის
სამსახური

ჯაფეაცვის
გაუმჯობესების
პროექტი

მაში, ასე, თქვენ ფილტვის ქრონიკული ოპსტრუქციული დაავადების დიაგნოზი დაგისვეს და საგონებელში ხართ ჩავარდნილი: ახლა რა უნდა იღონოთ?

პირველ რიგში გვინდა გითხრათ, რომ მარტო არ ხართ თქვენი დაავადების პირისპირ. 210 მილიონ ადამიანს მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში იგივე დაავადება ანუხებს. მათ გარდა ასეულობით მიღიონს შეიძლება ჰქონდეს ფქოდ, მაგრამ არ იცოდეს ამის შესახებ.

ფქოდ-ის მკურნალობა შესაძლებელია! თუმცა არ იკურნება, ექიმებს შეუძლიათ დაგეხმარონ და ფილტვების დაზიანების პროცესი შენელდეს. რაც უფრო ადრე დაისმება დიაგნოზი, უფრო მეტია შანსი ფილტვი შემდგომი დაზიანებისგან დავიცვათ. ამავე დროს არსებობს სხვადასხვა სამკურნალო საშუალება, რომელიც ადამიანებს დაავადების ნებისმიერ სტადიაზე დაეხმარება მდგომარეობა გაიუმჯობესონ და უფრო აქტიური ცხოვრებით იცხოვრონ. **ფქოდ-თან დაკავშირებით კვალიფიციური დახმარების მიღება არასოდეს არის გვიან.**

ამ დღიურის მიზანია დაგეხმაროთ უკეთ გაიგოთ დაავადების არსი, რაც საშუალებას მოგცემთ მნიშვნელოვანი როლი შეასრულოთ მკურნალობის დაგეგმვასა და მთლიანად, საკუთარი მდგომარეობის მართვაში.




რა არის ფერდ?


ფერდ აბრევიატურაა და „ფილტვის ქრონიკულ ობსტრუქციულ დაავადებად“ იშიფრება. ქრონიკულს ისეთ მდგომარეობას უწოდებენ რომელიც არ გაივლის, ობსტრუქცია კი შევიზროებას, გამავლობის შეზღუდვას ნიშნავს. ფერდ ფილტვების ხშირი დაავადებაა რომელიც ჰაერგამტარ გზებს ახშობს და ამით სუნთქვას უფრო რთულს ხდის. ეს დარღვევები ჩვეულებრივ ქრონიკულ ხველასა და ლორწოს ან ნახველის გამოყოფასთან არიან ასოცირებულნი.

მას შემდეგ რაც ეს დიაგნოზი დაგიდგინდათ, სამი მნიშვნელოვანი საწყისი ნაბიჯი გაქვთ გადასადგმელი. პირველი, დარწმუნდეთ რომ დიაგნოზი ზუსტია. ამისთვის კი ერთ-ერთი აუცილებელი ნაწილი სუნთქვის მარტივი ტესტის – ე.ნ. სპირომეტრის ჩატარება იქნება. ეს გამოკვლევა სწრაფი და უმტკიცნეულოა და მას მრავალი სამედიცინო დაწესებულება გთავაზობთ. მისი მაჩვენებლების გარეშე დასმული ფქოდ-ის დიაგნოზი, სხვა რომ არაფერი ვთქვათ, ეჭვს იწვევს.

A ნორმალური ფილტვი



B ფილტვები შეზღუდული დროს



მეორე ნაბიჯია, თქვენი ექიმის დახმარებით გაარკვიოთ ფილტვის დაავადების სპეციფიკური მიზეზები. ყველაზე ხშირად ფქოდ-ს თამბაქოს მოხმარება, კვამლთან ან მტვერთან შეხება იწვევს. მიზეზების ანუ “რისკფაქტორების” ცოდნა საკუთარი ჯანმრთელობის მართვისთვის გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯია.

და **მესამე**, ექიმთან ერთად შეადგინოთ თქვენთვის ოპტიმალური მკურნალობის გეგმა. გახსოვდეთ, ექიმს ბევრის გაკეთება შეუძლია თქვენი ჯანმრთელობის გასაუმჯობესებლად, მაგრამ უთქვენოდ ამას ვერ მოახერხებს. თქვენ გადამწყვეტი და უმთავრესი როლი გაქვთ თქვენივე ჯანმრთელობის მართვაში და თქვენი პასუხისმგებლობა ექიმთან სწორ კომუნიკაციას და შეთანხმებულ მოქმედებასაც გულისხმობს. თუ რაიმე არ გესმით, ექიმს არ ეთანხმებით, ან იცით რომ მის რეკომენდაციებს ვერ შეასრულებთ, აუცილებლად თქვით. მკურნალობის გეგმა ერთობლივად უნდა შეიმუშავოთ, მისი მნიშვნელობა გესმოდეთ და ეთანხმებოდეთ. მხოლოდ ასე შეძლებთ მის შესრულებას.

ფარდ-ის გამომცვევი მიზანი: (ავსებს სამედიცინო პერსონალი)

სუნთქვის გასაზომად

სპირომეტრია წარმოადგენს სასუნთქი ნაკადის შეზღუდვის გაზომვის ყველაზე უკეთ სტანდარტიზებულ, ობიექტურ მეთოდს და დაავადების დიაგნოსტიკისა და მისი პროგრესირების შეფასების ოქროს სტანდარტად რჩება.

ტესტის ჩატარება მარტივია და მცირე ხანი სჭირდება. ის სახელდობრ, ადგენს, რამდენ ჰაერს ამოისუნთქავთ და რამდენი დრო გჭირდებათ ამისთვის, ანუ ზომავს თქვენს გარეგან სუნთქვას.

სპირომეტრია რამდენიმე პარამეტრს აფასებს. მრავალრიცხოვან საერთაშორისო კვლევაზე დაყრდნობით მათგან $FEV1$ -ს (ფორსირებულ ამოსუნთქვის მოცულობას 1 წამში) განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა დაავადების დიაგნოსტიკისა და მასზე მეთვალყურეობის მიზნით, რის გამოც ექიმთან რეგულარულ ვიზიტებზე სწორედ ამ სიდიდის დაფიქსირება დაგჭირდებათ. როცა ფილტვის ფუნქცია ნორმალურია, ჩვეულებრივ, ჰაერის 80%-ს პირველ წამს ამოვისუნთქავთ. მაჩვენებელთა ფარდობის დაქვეითება



ჰაერის ნაკადის სიჩქარის შემცირებაზე მეტყველებს.

სპირომეტრის შედეგები აუცილებლად ჩაიწერეთ, რომ ტესტის განმეორებით ჩატარებისას შესაძლებელი გახდეს ძველი და ახალი მონაცემების შედარება და დაავადების პროგრესირების შეფასება.

ჩვენი ფილტვების ფუნქციის გაზომვის მაღარები (ავსებს სამაღისტო პერსონალი)			
თარიღი:	თარიღი:	თარიღი:	
წონა: _____ კგ	FEV1: _____ ლ; სავარაუდოს ____ %	ჟანგბადის სატურაცია: _____ %	
თარიღი:	თარიღი:	თარიღი:	
წონა: _____ კგ	FEV1: _____ ლ; სავარაუდოს ____ %	ჟანგბადის სატურაცია: _____ %	
თარიღი:	თარიღი:	თარიღი:	
წონა: _____ კგ	FEV1: _____ ლ; სავარაუდოს ____ %	ჟანგბადის სატურაცია: _____ %	


თამაშოსთვის თავის დანერგა პირველი და უმთავრესი ნაბიჯია ფქრდ-ის პრევენციისა და მკურნალობისთვის

თუ ფქრდ გაქვთ და მოწევას განაგრძობთ, ფილტვების მდგომარეობა გაგიუარესდებათ და დაავადება საბედისწერო გახდება. ფქრდ-ის გაღრმავება რომ შეაჩეროთ, ერთადერთი გზა მოწევის შეწყვეტაა.

თუ ეწევით, მაგრამ ფქრდ ჯერ არ გაქვთ, დაავადების თავიდან ასაცილებლად საუკეთესო გზაც მოწევის შეწყვეტაა.

გარდა ფქრდ-ისა, თამბაქო იწვევს:

- კიბოს (ფილტვის, ყელის, ენის);
- იმპოტენციასა და უნაყოფობას;
- გულის დაავადებას;
- განვითარების მანკებს;
- კანის დაბერებას;
- კბილების დაზიანებას.



პკითხეთ ექიმს, რით შეუძლია თანამედროვე მედიცინას დაგეხმაროთ მოწევისთვის თავის დანებებაში. სპეციალური მედიკამენტები და პროფესიონალის ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა მნიშვნელოვნად ზრდის თამბაქოსთვის თავის დანებების წარმატების შანსს. მოწევისთვის თავის დანებება არასოდეს არის გვიან.

მე და თამბაქო (ავსეპს სამედიცინო პერსონალი)			
თარიღი: მწეველობის სტატუსი: <input type="checkbox"/> არამწეველი <input type="checkbox"/> ყოფილი მწეველი <input type="checkbox"/> ამჟამად მწეველი	თამბაქოსთვის თავის დანებების გეგმა: <input type="checkbox"/> დიაბ; <input type="checkbox"/> არა; მედიკამენტი: <input type="checkbox"/> დიაბ; <input type="checkbox"/> არა; თამბაქოსთვის თავის დანებების თარიღი: _____	სტატუსის ცვლილება: თარიღი: _____	
სტატუსის ცვლილება: _____ თარიღი: _____	თამბაქოსთვის თავის დანებების გეგმა: <input type="checkbox"/> დიაბ; <input type="checkbox"/> არა; მედიკამენტი: <input type="checkbox"/> დიაბ; <input type="checkbox"/> არა; თამბაქოსთვის თავის დანებების თარიღი: _____	სტატუსის ცვლილება: თარიღი: _____	

ფერდ-ის მართვის გეგმა

ფქოდ-ის სამკურნალო მედიკამენტები თქვენი ფილტვების მდგომარეობაზე სხვადასხვა გზით მოქმედებენ. კერძოდ, მათი ნაწილი ამცირებს ბრონქების შევიწროებას და ამით ჰაერის ნაკადს თავისუფალი მოძრაობის საშუალებას აძლევს. სხვები ბრონქებში მიმდინარე ანთებით პროცესს და შეშუპებას ებრძვის. ზოგიერთი მედიკამენტი ფქოდ-ის დროს ფილტვებში ნახველის და ლორწოს ჭარბად წარმოქმნის პროცესზე მოქმედებს, ნახველის რაოდენობას ამცირებს, მის ადვილად ამოღებას უწყობს ხელს ან ფილტვებში ინფექციას ებრძვის. ფქოდ-ის დროს ასეთი პროცესები საკმაოდ ხშირია და გამწვავებების მიზეზი ხდება.

მედიკამენტები, რომლებიც ფქოდ-ის დროს გამოიყენება, ორ ძირითად ჯგუფად შეიძლება დაიყოს: **შეტევის მომხსნელი**, რომლებიც ძალიან სწრაფად იწყებს მოქმედებას და მათი მიღება სიმპტომების სწრაფად შემსუბუქების მიზნით არის რეკომენდებული და **მაკონტროლებელი** პრეპარატები, რომლებიც ყოველდღიურად ბრონქების გახსნილ მდგომარეობაში შენარჩუნების მიზნით უნდა გამოვიყენოთ.

შენიშვნები (მედიკამენტების გვერდითი ეფექტები, შეკითხვები ექიმთან განსახილველად)

თარიღი: _____

ჩემი ყოველდღიური საინპალაციო მედიკამენტები (ავსებს სამედიცინო პერსონალი)				
	მედიკამენტის დასახელება	დოზა	მიღების რეჟიმი და გზა	მოხსნის თარიღი (თუ საჭიროა)
შეტევის მომხსნელი				
გახანგრძლივებული მოქმედების				
საინპალაციო სტეროიდი				
კომპინირებული				
ნებულაიზერი				
სხვა მედიკამენტები ფქოფ-ისთვის				
მედიკამენტის დანიშვნის მიზანი	მედიკამენტის დასახელება	დოზა	მიღების რეჟიმი და გზა	სანგრძლივობა
ჟანგბადი				
მოსვენებულ მდგომარეობაში:	გაზრდილი ფიზიკური აქტიურობის დროს:	ძილში:		

ცვლილება ღაიხულებაში

ყოველდღიური საინჰალაციო მედიკამენტები (ავსებს სამედიცინო პერსონალი)					
დანიშვნის თარიღი	მედიკამენტის დანიშვნის მიზანი	მედიკამენტის დასახელება	დოზა	მიღების რეჟიმი და გზა	მოხსნის თარიღი (თუ საჭიროა)

სხვა მედიკამენტები ფქოდ-ისთვის

დანიშვნის თარიღი	მედიკამენტის დანიშვნის მიზანი	მედიკამენტის დასახელება	დოზა	მიღების რეჟიმი	ხანგრძლივობა

ჩემი ყოველდღიური მედიკამენტები (შეავსეთ თქვენ თვითონ)							
მედიკამენტი, ფორმა, დოზების რაოდენობა	ახალი კოლოფის გახსნის თარიღი						

ინჰალატორების გამოყენება

ფილტვებს წამალმა ადვილად რომ მიაღწიოს და დანარჩენ ორგანიზმზე არასასურველი გავლენა შემცირდეს, ფქოდ-ისთვის განკუთვნილი ზოგიერთი პრეპარატი შესასუნთქი ფორმით ინჰალატორის სახით გამოდის. ესენი ძალიან ეფექტური პრეპარატებია, ოღონდ მხოლოდ მაშინ თუ ხმარების წესებს ზუსტად იცავთ და ისინი ფილტვებში ხვდება და არა გარემომცველ ჰაერში. მოდით, ინჰალატორების მოხმარების წესებს ერთად გადავხედოთ.

ინჰალატორების ორი ძირითად ტიპი არსებობს: დოზირებული ინჰალატორი (MDI) და მშრალი ფხვნილის ინჰალატორი (DPI). MDI-ის ყოველი გამოყენებისას შესაძლებელია წამლის ფიქსირებული დოზის მიწოდება. ანალოგიურია DPI, მხოლოდ მასში წამალი ფხვნილის სახით არის წარმოდგენილი. დოზირებული ინჰალატორი წამლის კანისტრისა და სატუჩისგან შედგება. ინჰალატორზე დაჭერის შედეგად ადგილი აქვს წამლის გამოფრქვევას.

მშრალი ფხვნილის ინჰალატორები (DPI)

მშრალი ფხვნილის ინჰალატორი (DPI) დოზირებული ინჰალატორის (DPI) ანალოგიურია, მაგრამ მასში გამოყენებული წამალი ფხვნილის სახით არის წარმოდგენილი. DPI ინჰალატორის გამოყენება ზოგჯერ უფრო იოლია, რადგანაც მისი ამუშავება თქვენს სუნთქვასთან ერთად ხდება და თქვენ არ გჭირდებათ სუნთქვის დროში აწყობა. უბრალოდ სწრაფად უნდა შეისუნთქოთ, რათა წამალმა დაიწყოს თქვენს ფილტვებში მოძრაობა. თუმცა, არის გარკვეული პრობლემებიც, რომლებიც შეიძლება DPI-ს მოხმარებისას გაჩნდეს: თუ თქვენ DPI-ს მახლობლად ამოისუნთქავთ, ფხვნილი

შესაძლებელია გაიფანტოს და წამლის მეტი წილი თქვენს პირის ღრუში დარჩეს. ამას გარკვეული გვერდითი ეფექტები მოყვება. და ბოლოს, ზოგიერთ ადამიანში ფხვნილის შესუნთქვა ფილტვების გაღიზიანებას იწვევს.

MDI-ის სწორი გამოყენების წესები (აუცილებლად განიხილეთ ექიმთან ან ექთანთან ერთად და დარწმუნდით რომ აითვისეთ):

- 1) მოხსენით თავსახური;
- 2) ინჰალატორი დაიკავეთ სატურით ქვემოთ;
- 3) შეანჯღრიეთ ინჰალატორი;
- 4) სატური დაიჭირეთ თქვენი ტუჩებიდან 2-3 თითის მოშორებით;
- 5) მსუბუქად ამოისუნთქეთ;
- 6) თავი ოდნავ უკან გადასარეთ და ფართოდ გააღეთ პირი;
- 7) ინჰალატორის დაჭერასთან ერთად დაიწყეთ ნელი, ღრმა შესუნთქვა;
- 8) გააგრძელეთ ნელი ღრმა შესუნთქვა 5 წმ-ის განმავლობაში;
- 9) სუნთქვა შეიკავეთ 10წმ-ის განმავლობაში;
- 10) თუ ექიმმა ერთზე მეტი შესუნთქვა გამოგინერათ, გაიმეორეთ მე-3-9 საფეხურები.



როცა საქმე მცვავდება

ფერდ-ის ფონზე შესაძლოა თავი იჩინოს გამწვავებამ, როცა სიმპტომები მკვეთრად იმატებს და 24 საათზე მეტხანს გრძელდება. გამწვავების შემდეგ მდგომარეობის გაუმჯობესებას შესაძლოა საკმაო ხანი დასჭირდეს, ზოგჯერ კი გამწვავება ფილტვის ფუნქციის შეუქცევადი დაზიანების მიზეზიც ხდება.

გამწვავების ალბათობის შემცირება საკმაოდ მარტივი ხერხებით შეიძლება:

1. ძალიან ხშირად გამწვავება სასუნთქი გზების ინფექციებთან (გრიპსა და გაციებასთან) არის დაკავშირებული, ამიტომ:

- ჩაიტარეთ ანტიპრობოკოური ვაქცინაცია და ყოველწლიურად აიცერით გრიპზე;
- ხშირად დაიბანეთ ხელები, გამოიყენეთ ხელის სადეზინფექციო ხსნარი და დაიცავით ჰიგიენა, რომ ინფექციის ალბათობა შეამციროთ.

2. სხვა შემთხვევაში გამწვავებები ჰაერის დაბინძურებითაა გამოწვეული, ამიტომ:

- თავი დაანებეთ მოწევას, არავის მისცეთ უფლება, თქვენთან ახლოს მოწიოს;
- თუ განსაზღვრულ დღეებში გარეთ ჰაერი დაბინძურებულია, შინ დარჩით და ფანჯრები დახურეთ.

3. წამლები ზუსტად ისე მიიღეთ, როგორც ექიმმა დაგინიშნათ. სთხოვეთ ექიმს, შეამოწმოს, სწორად იყენებთ თუ არა ინპალატორს.

4. ეცადეთ, ორგანიზმი მოიძლიეროთ. რეგულარულად ისეირნეთ, ივარჯიშეთ და ჯანსაღი საკვები მიირთვით.

მნიშვნელოვანია: საკუთარი გულისცემის და სუნთქვის სიხშირის ცოდნა

როგორც ფქოდ-ით დაავადებული ადამიანისთვის, თქვენთვის ძალზედ მნიშვნელოვანია იცოდეთ საკუთარი გულისცემისა და სუნთქვის სიხშირე იმ დროს, როდესაც თავს კარგად გრძნობთ. ამ მონაცემებს თქვენი “საწყისი” მაჩვენებლები ეწოდებათ.

როდესაც იგრძნობთ გამწვავების მოახლოებას, დაითვალიერეთ საკუთარი გულისცემისა და სუნთქვის სიხშირე. შეადარეთ შედეგები საწყის მაჩვენებლებს.

იმის ცოდნა, გაიზარდა თუ არა გულისცემისა და სუნთქვის სიხშირე, დაგეხმარებათ ექიმთან დაავადების გამწვავებაზე საუბარში. ექიმი კი ამ ინფორმაციას გამოიყენებს გადაწყვეტილების მისაღებად, როგორ უმკურნალოს თქვენს გამწვავებას.

როგორ დავთვალიოთ სუნთქვა და გულისცემა?

- 1) ხელი დაიდეთ გულმკერდის ზედა ნაწილზე ისე, რომ იგრძნოთ მისი მოძრაობა. გულმკერდის ერთი ასვლა-ჩასვლა ერთი სუნთქვითი მოძრაობაა;
- 2) დანიშნეთ წამმზომი. დაითვალიერეთ სუნთქვითი მოძრაობების რაოდენობა 30 წმ-ში და გაამრავლეთ ორზე.

ზრუნვა ფილტვების ჯანმრთელობაზე (ავსებს სამედიცინო პერსონალი)			
გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინა	თარიღი:	შემდგომი ვაქცინაციის თარიღი:	
პნევმოკოკის საწინააღმდეგო ვაქცინა	თარიღი:	შემდგომი ვაქცინაციის თარიღი:	

ჩემი სამოქადო გეგმა

ღიად დატოვებული გრაფები უნდა შეავსოს თქვენმა ექიმმა.

მწვანე ზონა: მე დღეს კარგად ვარ	როგორ ვიქცევი
<ul style="list-style-type: none"> აქტიურობის და ფიზიკური დატვირთვის ჩვეულებრივი დონე; ხველა და ნახველი ჩვეული ინტენსივობით; ღამე კარგად გძინავთ; მაღა დამაკმაყოფილებელია. 	<ul style="list-style-type: none"> მიიღეთ ყოველდღიურად მედიკამენტები; ჟანგბადი გამოიყენეთ დანიშნულებისამებრ; გაავრძელეთ რეგულარული ფიზიკური აქტიურობის/კვების გეგმა; ყოველთვის მოერიდეთ თამბაქოს კვამლს, შესასუნთქ გამლიზიანებელ ნივთიერებებს.



ყვითელი ზონა: დღეს ჩემთვის ცუდი დღე იყო ან მქონდა ფქოდ-ის გამწვავება*	როგორ ვიქცევი
<ul style="list-style-type: none"> • სუნთქვის გაძნელება ჩვეულებრივზე მეტად; • ნაკლები ენერგია ყოველდღიური საქმიანობისათვის; • ნახველის გამოყოფის გაძლიერება ან გასქელება; • ნახველის ფერის ცვლილება; • ქვემო კიდურების შეშუპება ჩვეულებრივზე მეტად; • ჩვეულებრივზე ინტენსიური ხველა; • ისეთი თვითშეგრძნება, თითქოს “გულმკერდი გაცივდა”; • ცუდი ძილი და სიმპტომების გამო ღამით გაღვიძება; • მაღის გაუარესება; • ყოველდღიური მედიკამენტების ეფექტურობის შემცირება. 	<ul style="list-style-type: none"> • გააგრძელეთ ყოველდღიურად მედიკამენტების მიღება; • შეტევის მომსხნელი ინჰალატორი შეისუნთქეთ სთ-ში ერთხელ; • დაიწყეთ პრედნიზოლონი: _____ • დაიწყეთ ანტიბიოტიკი: _____ • მიიღეთ ჟანგბადი დანიშნულებისამებრ; • უფრო მეტად დაისვენეთ; • ისუნთქეთ წინ წამონეული ტუჩებით; • ყოველთვის მოერიდეთ თამბაქოს კვამლს, შესასუნთქ გამლიზიანებელ ნივთიერებებს; • დაურეკეთ ექიმს, თუ სიმპტომები არ უმჯობესდება.

* დაუყოვნებლივ დაურეკეთ ექიმს, თუ ჩივილები გრძელდება და არ უმჯობესდება (იხ. წითელი ზონა)

წითელი ზონა: გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება მჭირდება	როგორ ვიქცევი
<ul style="list-style-type: none"> • სუნთქვის ძლიერი უკმარისობა მოსვენებულ მდგომარეობაშიც კი; • სუნთქვის გაძნელების გამო ნებისმიერი საქმიანობის შეუძლებლობა; • სუნთქვის გაძნელების გამო ძილის შეუძლებლობა; • ცხელება ან შემცივნება; • ძლიერი გაბრუების ან აბნევის შეგრძნება; • ტკივილი გულის არეში; • სისხლიანი ხველა. 	<ul style="list-style-type: none"> • გამოიძახეთ სასწრაფო სამედიცინო დახმარება ან სთხოვეთ ვინმეს მიგიყვანოთ გადაუდებელი დახმარების დაწესებულებაში; • გაზარდეთ ჟანგბადის მოხმარება: _____ მდე; • მიიღეთ პრედნიზოლონი: _____

რა არ უნდა გააკეთოთ გამწვავების დროს

- არ მიიღოთ ეუფილინი ან არ გაზარდოთ მისი დოზა ექიმის დანიშნულების გარეშე;
- არ მიიღოთ კოდეინი ან ხველის დამთრგუნველი რომელიმე სხვა პრეპარატი;
- არ გამოიყენოთ ცხვირის წვეთები 3 დღეზე მეტი ხნის განმავლობაში;
- არ მოწიოთ;
- თუ ჩივილები გიგრძელდებათ, არ დააყოვნოთ ექიმთან დაკავშირება 24 საათზე მეტად.

ფერდ-ის გამწვავებების ისტორია - შეავსეთ თქვენ თვითონ

გამწვავების თარიღი	რომელი მედიკამენტები დამჭირდა	საავადმყოფოში მკურნალობა
_____	_____	<input type="checkbox"/> დიახ <input type="checkbox"/> არა თარიღი: _____
_____	_____	<input type="checkbox"/> დიახ <input type="checkbox"/> არა თარიღი: _____
_____	_____	<input type="checkbox"/> დიახ <input type="checkbox"/> არა თარიღი: _____

იფიქრეთ საერთო ჯანმრთელობაზე

რადგან ფქოდ ძირითადად ხანდაზმულ ასაკში ვითარდება, ფქოდ-ით დაავადებულ მრავალ პაციენტს პარალელურად სხვა დაავადებებიც აქვს, როგორიცაა:

- გულისა და სისხლძარღვების დაავადება
- სისხლის მაღალი წნევა
- ოსტეოპოროზი
- ჩონჩხისა და კუნთების დაავადებები
- დეპრესია და/ან შფოთვა
- სიმსუქნე ან წონის ნაკლებობა
- შაქრიანი დიაბეტი

ჰკითხეთ თქვენს ექიმს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული იმ საკითხებისა და სიმპტომების შესახებ, რომლებიც განუხებთ. არსებობს მკურნალობის სხვადასხვა საშუალებები, რომლებიც დაგეხმარებათ თავი უკეთ იგრძნოთ და იყოთ უფრო აქტიური.

სხვა დაავადებები (ავსებს სამედიცინო პერსონალი)

<input type="checkbox"/> ანემია	<input type="checkbox"/> შფოთვა/პანიკა	<input type="checkbox"/> სახსრების ანთება	<input type="checkbox"/> სისხლის თრომბი
<input type="checkbox"/> სიმსივნე	<input type="checkbox"/> დეპრესია	<input type="checkbox"/> დიაბეტი	<input type="checkbox"/> გასტრო-ეზოფაგური რეფლუქსი
<input type="checkbox"/> გულის დაავადება	<input type="checkbox"/> მაღალი არტერიული წნევა	<input type="checkbox"/> უძილობა	<input type="checkbox"/> თირკმელების/პროსტატის პათოლოგიები
<input type="checkbox"/> ოსტეოპოროზი	<input type="checkbox"/> სხვა		

დაციმულება სხვა დაავადებებთან დაკავშირებით

თარიღი _____

ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტები (ავსებს სამედიცინო პერსონალი)			
მედიკამენტის დანიშვნის მიზანი	მედიკამენტის დასახელება	დოზა	მიღების რეჟიმი და გზა

შენიშვნები და რეკომენდაციები თანმხლებ დაავადებებთან დაკავშირებით:



უფრო ჯანსაღი ცხოვრებისთვის

ცხოვრების წესის მარტივი ცვლილებებით მხოლოდ ვერდი-ის სიმპტომებს კი არ შეიმსუბუქებთ, არამედ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ სხვა პრობლემებსაც შეამცირებთ. მაგალითად, თქვენ შეგიძლიათ:

- ივარჯიშოთ და იყოთ აქტიური;
- მონაწილეობა მიიღოთ რეაბილიტაციის პროგრამაში;
- მიაღწიოთ და შეინარჩუნოთ ჯანსაღი წონა;
- იკვებოთ ჯანსაღად;
- შეწყვიტოთ თამბაქოს მოწევა.



ამით თქვენს გულს, ძვლებს და ა.შ. ისევე დაეხმარებით, როგორც ფილტვებს!

ცხოვრების ჯანსაღ წესთან დაკავშირებული რეკომენდაციები (ავსებს სამედიცინო პერსონალი)			
ფიზიკური აქტიურობის გეგმა	<input type="checkbox"/> ფეხით სიარული; <input type="checkbox"/> სხვა ____ წთ/დღეში ____ დღე კვირაში	პულმონური რეაბილიტაცია <input type="checkbox"/> დიახ; <input type="checkbox"/> არა	
კვების გეგმა <input type="checkbox"/> დიახ; <input type="checkbox"/> არა	სამიზნე წონა:		
რეკომენდაციები:			

ცხოვრების გაჯანსაღების ჩამი გეგმა

(შეადგინეთ თქვენს ექიმთან ერთად):

თარიღი: _____

რა ცვლილება მინდა განვახორციელო: _____

მიზანი შემდეგი თვისთვის: _____

კონკრეტულად რა ნაბიჯებს გადავდგამ იმისთვის, რომ მივაღწიო მიზანს (რა, როდის, სად,
რამდენი, რა სიხშირით): _____

რამ შეიძლება გაართულოს ჩემს მიერ მიზნის მიღწევა:

რას ვგეგმავ ამ სირთულეების გადასაჭრელად:

ვის ვთხოვო დახმარება საკუთარი მიზნების მისაღწევად:

რამდენად დარწმუნებული ვარ გეგმის შესრულებაში (ქულები 1-10, სადაც 10 ნიშნავს აპსოლუტურ დარწმუნებულობას)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
დარწმუნებული ვარ, რომ ვერ მოვახერხებ					აპსოლუტურად და-რწმუნებული ვარ, რომ შევასრულებ				

გადახედვის თარიღი:

(საჭიროების შემთხვევაში ანალოგიური გრაფები გადაიტანეთ სუფთა ფურცელზე და ჩააკარით დღიურში).

ფქრდ-ის ზეგავლენა ჩვევი ცხოვრების ხარისხი

სამედიცინო კვლევების საბჭოს მოდიფიცირებული ტესტი mMRC (Modified Medical Research Council Questionnaire) სუნთქვის უკმარისობის ხარისხის და, შესაბამისად, ფქოდის ცხოვრების ხარისხზე ზეგავლენის შეფასების საშუალებას გვაძლევს. შეავსეთ ექიმთან ყოველი ვიზიტის წინ და თარიღი და ჯამური ქულა შეიტანეთ შესაბამის ცხრილში

ქულა	ფიზიკურ აქტიურობასთან დაკავშირებული სუნთქვის უკმარისობის ხარისხი
0	ჰაერის უკმარისობა ვითარდება მხოლოდ ძლიერი ფიზიკური დატვირთვის ფონზე
1	ჰაერის უკმარისობა კიბეებზე სწრაფად ასვლის ან მცირე აღმართის ავლის შემდეგ მეწყება.
2	ჰაერის უკმარისობის გამო ჩემი ასაკის ადამიანებთან შედარებით უფრო ნელა ავდივარ სიმაღლეზე, ან ჩვეულებრივ ტემპში 15 წუთის მანძილზე სიარულის შემდეგ დასასვენებლად შეჩერება მიხდება
3	სუნთქვის უკმარისობის გამო ვჩერდები 100 მეტრის გავლის შემდეგ ან კიბეებზე ასვლისას რამდენიმე წუთში
4	ჰაერის უკმარისობა ხელს მიშლის სახლიდან გასვლაში, ან ჰაერის უკმარისობა გახდა-ჩაცმის დროს მეწყება.

თარიღი									
mMRC ქულა									

ფქრდ-ის შეფასების ტესტი (CAT)

ეს კითხვარი თქვენს ჯანმრთელობასა და ყოველდღიურ ცხოვრებაზე ფქრდ-ის ზეგავლენას აფასებს. თითოეული პასუხისთვის აღნიშნეთ ყველაზე შესაბამისი ქულა და ტესტის ბოლოს დააჯამეთ ქულები. შეავსეთ ექიმთან ყოველი ვიზიტის წინ და თარიღი და ჯამური ქულა შეიტანეთ შესაბამის ცხრილში.

არასოდეს ვახველებ	1 2 3 4 5	მუდმივად ვახველებ	
საერთოდ არ მაქვს ნახველი	1 2 3 4 5	ფილტვები სავსე მაქვს ნახველით	
საერთოდ ვერ ვგრძნობ გულმკერდის შებოჭილობას	1 2 3 4 5	გულმკერდში ძლიერ შებოჭილობას ვგრძნობ	
როდესაც ავდივარ კიბეზე ერთ სართულზე ან აღმართზე, არ მაქვს სუნთქვის უკმარისობა	1 2 3 4 5	მაქვს სუნთქვის ძლიერი უკმარისობა ერთ სართულზე ან აღმართზე ასვლისას	
საერთოდ არ ვარ შეზღუდული სახლში საქმიანობის დროს	1 2 3 4 5	ძლიერ შეზღუდული ვარ სახლში საქმიანობისას	
მიუხედავად ფილტვების მდგ-ბისა უპრობლემოდ გავდივარ გარეთ	1 2 3 4 5	უშიშრად ვერ გავდივარ გარეთ ფილტვების მდგომარეობის გამო	
ღამით კარგად მძინავს	1 2 3 4 5	ღამით მშვიდად არ მძინავს ფილტვების მდგომარეობის გამო	
საკმაოდ ენერგიული ვარ	1 2 3 4 5	საერთოდ არ მაქვს ენერგია	
თარიღი			
CAT ქულათა ჯამი			

შენიშვნებისათვის:

ଶ୍ରେଣୀଶ୍ଵରେଷ୍ଟିକ୍ସାତ୍ତ୍ଵବିଦ୍ୟା:

აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ჯანდაცვის გაუმჯობესების პროექტი და შერჩეული სამედიცინო დაწესებულებები მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში გამოცდილი წარმატებული მეთოდიყით ერთად ცდილობენ, სამედიცინო მომსახურების მაღალი ხარისხი ნებისმიერი თქვენგანისთვის ყოველთვის ხელმისაწვდომი იყოს. ამავე დროს, თქვენი, ჰაციენტის, აქტიური მონაწილეობის გარეშე მედიცინის მუშაკებს გაუჭირდებათ, ჯანმრთელობა საგრძნობლად გაგიუმჯობესონ. თქვენ უნდა გახდეთ აქტიური და ინტორნმი-რებული გადაწყვეტილების მიმღები საკუთარი ჯანმრთელო-ბის მართვისას. მხოლოდ ამ შემთხვევაში შეძლებთ, ხან-გრძლივი და ხარისხიანი სიცოცხლით დატყებეთ. იმედი გვაქვს, ამ სერიის მასალები მიზანთან დაგაახლოებთ.



USAID
აშშის სამსახური

აჯღავენი
გაუმჯობესების
პროექტი



ფასაცუბათა კონტროლისა და
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის
ეროვნული ცენტრი